



KAŁ W KIERUNKU:

Rota-/adeno-/noro-/enterowirusów oraz *C.difficile* i laktoferyny

Przygotowanie:

Zaleca się, aby badanie wykonać przed leczeniem przeciwdrobnoustrojowym lub minimum 5 dni po zakończeniu leczenia. Jeśli konieczne jest badanie podczas antybiotykoterapii, próbkę kału należy pobrać przed podaniem kolejnej dawki leku.

Należy zaopatrzyć się w jednorazowy jałowy pojemnik z łopatką i nakrętką do pobierania kału (dostępne w aptece).

W dniu badania:

Przed pobraniem materiału należy całkowicie opróżnić pęcherz. Kał należy oddać do wyparzonego, wysuszonego pojemnika lub na czysty papier toaletowy. Następnie należy pobrać szpatułką porcję kału – wielkości orzecha laskowego lub w przypadku płynnego kału ok 1-2 ml.

Materiał najlepiej pobrać z kilku miejsc ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zawierających śluz, ropę, czy krew.

Pobrany materiał opisać imieniem, nazwiskiem, datą i godziną pobrania i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Jeśli nie jest to możliwe przechowywać w lodówce w temperaturze +2°C do +8°C, ale nie dłużej niż 24 godziny.

W przypadku gdy zleconych jest więcej badań kału, próbki materiału należy dostarczyć w osobnych pojemnikach.

UWAGA: Kobiety mogą wykonywać badanie co najmniej 3 dni po zakończonej miesiączce.