



POBIERANIE PLWOCINY

Przygotowanie:

- Protezy/wkładki zębowe należy wyjąć poprzedniego dnia wieczorem, przed rozpoczęciem higieny jamy ustnej.
- Pojemnik na materiał należy otworzyć dopiero w momencie pobierania materiału.
- W przypadku trudności z odkrztuszeniem plwociny należy zastosować metody wspomagające (oklepywanie pleców, nawadnianie pacjenta, podanie leków mukolitycznych, inhalacje hipertonicznym roztworem NaCl lub środkiem mukolitycznym).

W dniu badania:

- Plwocina powinna być odkrztuszona rano, na czczo, po uprzednim wypłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą
- Należy wykrztuszać bezpośrednio do jałowego pojemnika
- Ilość plwociny powinna wynosić od 2 do 4 ml.

Pobrany materiał opisać imieniem, nazwiskiem, datą i godziną pobrania i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Jeśli nie jest to możliwe przechowywać w lodówce w temperaturze $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$, ale nie dłużej niż 24 godziny.

Plwocina w kierunku prątka gruźlicy: Należy dostarczyć 3 próbki w ciągu 3 kolejnych dni.