

Endoskopowa Polipektomia

Jakie są powody wykonania badania:

Endoskopową polipektomię wykonuje się w przypadku stwierdzenia polipów jelita grubego. Polipy to najczęściej łagodne nowotwory, które w miarę upływu czasu mogą ulec przemianie do nowotworu złośliwego – raka jelita grubego. Usuwanie polipów zapobiega tej przemianie. Endoskopowe odcinanie polipów jest zabiegiem niebolesnym, i poza dolegliwościami związanymi z samą kolonoskopią nie wywołuje żadnych negatywnych objawów.

Alternatywną metodą usuwania polipów jest zabieg chirurgiczny z otwarciem powłok brzusznych (operacja) – zwykle tego typu metodę stosuje się w przypadku niemożności usunięcia polipa drogą endoskopową.

Jak przeprowadza się polipektomię:

W trakcie badania kolonoskopowego przez specjalny kanał wysuwa się pętlę diatermiczną z drutu, zarzuca na polipa i zaciskając ją odcina polip. Przy większych polipach wymagane jest zastosowanie prądu elektrycznego przepływającego przez pętlę, małe polipy odcina się bez użycia prądu.

Korzyści z zabiegu: Usunięcie polipów jelita grubego znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jelita grubego

Konsekwencje braku zgody na polipektomię: Zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju raka jelita grubego

Powikłania mogące wystąpić w trakcie polipektomii:

1. Krwawienie z miejsca po polipektomii, które zwykle można zatrzymać przy użyciu narzędzi endoskopowych, ale czasem wymaga pilnego zabiegu operacyjnego.
2. Przedziurawienie ściany jelita – wymaga polnej operacji.
3. Termiczne uszkodzenie ściany jelita bez przedziurawienia – zwykle wymaga obserwacji w warunkach szpitalnych i zastosowania antybiotyku.

Powikłania po polipektomii zdarzają się bardzo rzadko – w około 1% przypadków.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa proszę odpowiedzieć TAK, NIE lub NIE WIEM na następujące pytania:

1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiększone skłonność do krwawień
lub sińców po niewielkich urazach?
2. Czy przyjmuje Pani/Pan leki zmniejszające krzepliwość krwi?

PROSZĘ ODWRÓCIĆ STRONĘ

Postępowanie po badaniu:

Bezpośrednio po badaniu może występować uczucie wzdęcia i pobołowanie brzucha utrzymujące się do 30 min. W przypadku badania w znieczuleniu ogólnym nie wolno jeść, ani pić przez okres 2 godzin.

Proszę poinformować swojego lekarza POZ lub lekarza Pogotowia Ratunkowego jeżeli w ciągu kilku godzin po badaniu wystąpi silny ból brzucha, czarny stolec, gorączka lub inne niepokojące Państwa objawy.

Świadoma zgoda Pacjenta:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ulotki i jest ona dla mnie zrozumiała.

Miałem/am możliwość zadawania pytań personelowi przed badaniem i uzyskałem/am zrozumiałe odpowiedzi i wyjaśnienia.

Udzieliłem/am pełnych i prawdziwych odpowiedzi na temat mojego stanu zdrowia i przyjmowanych leków.

Wyrażam zgodę na wykonanie polipektomii endoskopowej oraz inne niezbędne procedury medyczne w przypadku wystąpienia powikłań

Data.....Podpis.....

Ze względu na różny czas badania i konieczność wykonywania w naszej pracowni pilnych badań pacjentów hospitalizowanych zaplanowany termin badania może się przesunąć do około 3 godzin – proszę o zarezerwowanie sobie odpowiedniej ilości czasu