

Panendoskopia/Gastroskopia

Jakie są powody wykonania badania:

Badanie gastroskopowe wykonuje się w celu bezpośredniego obejrzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego – przełyku, żołądka i początkowej części dwunastnicy. Decyzję o skierowaniu Pacjenta na badanie podejmuje się zwykle na podstawie wcześniej zebranego wywiadu, badania fizykalnego i/lub badań dodatkowych, gdy podejrzewamy obecność zmian chorobowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

Metody alternatywne: W trakcie innych badań takich jak usg jamy brzusznej, badań radiologicznych i laboratoryjnych możemy również w pewnych wypadkach ocenić górny odcinek przewodu pokarmowego, ale badanie endoskopowe jest badaniem najdokładniejszym, a dodatkowo umożliwia pobranie testu w kierunku *Helicobacter pylori* i wycinków do oceny histologicznej (mikroskopowej).

Jak przeprowadza się badanie gastroskopowe:

Badanie przeprowadza się w pozycji leżącej na lewym boku. Przed badaniem należy usunąć protezy zębowe i aparat słuchowy jeżeli znajduje się w lewym uchu.

Jeżeli Pacjent wyraża zgodę i nie ma przeciwwskazań medycznych gardło znieczula się 2% roztworem-em Lignocainy. Między zęby zakłada się plastikowy ochronny ustnik. Endoskop ma średnicę ok 1 cm - często kawałki pokarmów, które połykamy w trakcie jedzenia są większe. Lekarz zakłada endoskop przez usta i gardło do przełyku – moment zakładania może być nieprzyjemny (powodować odruchy wymiotne, kaszel, uczucie braku powietrza), ale trwa krótko. W trakcie kilkuminutowego badania lekarz ocenia błonę śluzową i jeśli trzeba pobiera wycinki. W trakcie badania może występować uczucie pełności w jamie brzusznej, ale samo badanie i pobieranie wycinków jest niebolesne. Cały sprzęt endoskopowy jest przed każdym badaniem specjalnie dezynfekowany, a narzędzia endoskopowe (np. kleszczyki do pobierania wycinków) sterylne.

Korzyści z przeprowadzenia badania: Postawienie właściwej diagnozy.

Powikłania mogące wystąpić w trakcie badania:

Powikłania panendoskopii zdarzają się niezwykle rzadko, jednakże całkowitego bezpieczeństwa w trakcie badania nie da się zagwarantować. Sporadycznie (raz na kilka tysięcy badań) może dojść do przedziurawienia (perforacji) przewodu pokarmowego. Może także wystąpić krwawienie po pobraniu wycinków. Tego typu powikłania mogą wymagać leczenia operacyjnego (chirurgicznego). Rzadko może dochodzić do innych powikłań: zaburzeń rytmu serca, gwałtownych skoków ciśnienia, napadu duszności w astmie, napadu drgawkowego, a nawet zatrzymania akcji serca.

PROSZĘ ODWRÓCIĆ STRONĘ

W celu zwiększenia bezpieczeństwa proszę odpowiedzieć TAK, NIE lub NIE WIEM na następujące pytania:

1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiększone skłonność do krwawień
lub sińców po niewielkich urazach?
2. Czy przyjmuje Pani/Pan leki zmniejszające krzepliwość krwi?
3. Czy jest Pan/Pani uczulona na pokarmy lub leki w tym lignocainę?

Postępowanie po badaniu:

Z powodu miejscowego znieczulenia gardła przez 2 godziny nie wolno spożywać pokarmów, żeby uniknąć zadławienia. Po 30 minutach po badaniu można popijać płyny małymi łykami. Proszę poinformować swojego lekarza POZ lub lekarza Pogotowia Ratunkowego jeżeli w ciągu kilku godzin po badaniu wystąpi silny ból brzucha, czarny stolec, gorączka lub inne niepokojące Państwa objawy.

UWAGA: Przed badaniem należy pozostać na czczo co najmniej 6 godzin. Wszystkie planowe leki nasercowe, przeciw nadciśnieniu, astmie, padaczkę należy przyjąć na 3 godziny przed badaniem popijając małą ilością wody

Świadoma zgoda Pacjenta:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ulotki i jest ona dla mnie zrozumiała. Miałem/am możliwość zadawania pytań personelowi przed badaniem i uzyskałem/am zrozumiałe odpowiedzi i wyjaśnienia. Udzieliłem/am pełnych i prawdziwych odpowiedzi na temat mojego stanu zdrowia i przyjmowanych leków.

Wyrażam zgodę na badanie panendoskopii z pobraniem wycinków oraz inne niezbędne procedury medyczne w przypadku wystąpienia powikłań

Data.....Podpis.....

Wyrażam zgodę na znieczulenie gardła preparatem Lidocainy 10 %

DataPodpis.....

Ze względu na różny czas badania i konieczność wykonywania w naszej pracowni pilnych badań pacjentów hospitalizowanych zaplanowany termin badania może się przesunąć do około 3 godzin – proszę o zarezerwowanie sobie odpowiedniej ilości czasu